

增訂本草備要

增訂本草備要卷之二

休寧汪 昂訥菴著輯 男汪 端其兩

弟汪 桓燮武叅訂 姪汪惟寵子錫

同鄭魯慶贊襄同訂 姪壻仇 澣天一同較

草部

而補血 馮伏火

牡丹皮 辛苦微寒入手足少陰心。厥陰。肝。心包。為血中狀。

火。色升故入血分。時珍曰。伏火。即陰火也。陰火。即和火也。世人專以黃柏治相火。不知丹皮之功。更勝於柏。

景腎氣。和血涼血而生血。血熱則枯。破積血。新血不

生。通經脉為吐衄必用之藥。血屬陰本靜因火治中

風五勞驚癇瘵。筋脉伸縮抽掣為瘵或手足抽掣

時止為癇皆陰虛血熱風火相搏痰隨火湧所致除煩熱療癰瘡。涼下胞胎退

無汗之骨蒸。張元素曰丹皮治無汗之骨蒸地骨皮治

足少陰故仲景腎氣丸用丹皮治神志不足也按內經云水之精為志故腎藏志火之精為神故心藏神

單瓣花紅者入藥肉厚者佳酒拌蒸用畏貝母兔絲大

黃忌蒜胡荽伏砒。時珍口花白者補赤者利人所罕悟宜分別之

續斷 苦溫補腎辛溫補肝能宣通血脉而理筋骨主傷

補肝腎理筋骨

中補不足。經疏云味煖子宮。縮小便。破瘀血。治腰痛。胎

漏。懷妊崩帶遺精。腸風血痢。是齋方平胃散一兩川續

下。治時。癰痔。腫毒。又主金瘡折跌。以功止痛生肌。女科

外科。需為上劑。川產良。狀如雞脚皮。黃皺節節斷者

真去。向裏硬筋。酒浸用。地黃為使。

骨碎補。苦溫補腎。故治耳鳴。耳鳴必及腎虛久瀉。研末

腎嚴熱。空心食之。腎主二便。久腎主骨。故治折傷。以功

傷多。為腎虛。不可專責脾胃也。腎主骨。故治折傷。以功

傷和。傅牙痛。妙黑為末擦又入厥陰。心包能破血止。

補腎治  
折傷  
經曰腎  
者胃之  
關也前  
陰利水

本草  
續斷  
骨碎補

後陰利殺。通行於血。生新。

人血行傷故治折傷。根似薑而扁長去毛用。或蜜拌蒸。

益母草一名荊薊。辛微苦寒。入手足厥陰。肝。心包。消水。行血。去。

瘀生新。調經解毒。治血風血運。血痛血淋。胎漏。

產難。崩中帶下。帶脉橫于腰間。病生于此。故名爲帶。赤。

提血虛者。養血爲經。產良藥。消疔腫。乳癰。亦取其散通。

大小便然。辛散之藥。腫子散。大者忌服。益母子主治。

畧同。調經益精明目。活血順氣。逐風。氣行則。

風散。行中有補。治心煩頭痛。胎產。帶崩。令人有。

通行血  
消水

子。有補陰之功。時珍曰。益母根莖花葉實皆可同用。若  
治瘡腫胎產消水行血則宜並用。若治血分風熱明  
目調經用子為良。蓋根莖花葉專于行。子則行中有補  
也。在寶濟陰返魂丹。小暑端午或六月六日採益母莖  
葉花實為末。蜜丸。治胎產百  
病。近効方搗汁熬膏亦良。忌鐵。子微炒用。

澤蘭 苦泄熱。甘和血。辛散鬱。香舒脾。入足太陰厥陰肝脾

通九竅。利關節。養血氣。長肌肉。破宿血。調月經。消癥瘕。

散水腫。防已治產後血滯腰痛。未盡吐。血鼻洪。目痛。頭

風癰毒撲損。補而不滯。行而不峻。女科要藥。古方澤蘭  
尤甚多。

時珍曰。蘭草澤蘭一類二種。俱生下濕紫莖素枝赤

節綠葉葉對節生有細齒但以莖圓節長葉光有岐者

爲蘭草莖微方節短葉有毛者爲澤蘭嫩時並可採音那

而佩之楚詞所謂紉秋蘭以爲佩是也朱文公離騷辨證云必花葉俱

香燥濕不變方可刈佩今之蘭蕙花雖香而葉無氣質弱易萎不可刈佩吳人呼爲香草俗

名孩兒菊夏月采置髮中則髮不腫浸油塗髮去垢香澤故名澤蘭蘭草走氣分故

能利水道除痰癖殺蠱辟惡而爲消渴良藥經曰數食肥甘傳爲

消渴治之以澤蘭走血分故能消水腫塗癰毒破瘀除

癥而爲婦人要藥以爲今之山蘭者誤矣防已爲使宗冠

蘭產爲  
勝則建  
蘭矣

既名幽  
蘭王合  
騷經矣

升菴九  
種多有  
未確故  
陳文燭  
作正楊  
以辨之

藥朱丹溪並以蘭草爲山蘭之葉李時珍考衆說以說  
之按別本云蘭葉甘寒清肺開胃消痰利水解鬱調經  
開產者力勝李士材云蘭葉稟金水之氣故入肺藏東  
垣方中嘗用之內經所謂治之以蘭除陳氣者是也余  
屢驗之李時珍又謂東垣所用乃蘭草也其集諸家之  
言曰陳遜齋閑覽云楚騷之蘭或以爲都梁香或以爲  
澤蘭或以爲猗蘭當以澤蘭爲正今之所種如麥門冬  
者名幽蘭非真蘭也故陳止齋著盜蘭說以說之方虛  
谷訂蘭說言古之蘭草卽今之千金草俗名孩兒菊者  
今之所謂蘭其葉如茅者根名土續斷因花馥郁故得  
蘭名楊升菴云世以如蒲萱者爲蘭九畹之受誣也久  
矣又吳草廬有蘭說云蘭爲醫經上品有枝有莖草之  
植者也今所謂蘭無枝無莖因黃山谷稱之世遂謬指  
爲離騷之蘭寇氏本草弱于流俗反疑舊說爲非夫醫  
經爲實用豈可誣哉今之蘭果可以利水殺蟲而除痰  
癖乎其種盛于閩朱子閩人豈不識其土產而辨析若



此世俗至今猶以非蘭爲蘭何其惑之甚也。昂按朱子  
辨蘭援離騷紉佩以爲證。竊謂紉佩亦騷人風致之詞  
耳。如所云飲木蘭之墜露。餐秋菊之落英。豈真露可飲  
而英可餐乎。又云製芰荷以爲衣。集芙蓉以爲裳。豈真  
芰荷可衣。芙蓉可裳乎。宋儒釋經執泥。恐未可爲定論  
也。第騷經既言秋蘭。則非春蘭明矣。本經既言澤蘭。則  
非山蘭明矣。是離騷之秋蘭當屬本經之澤蘭無疑也。  
然離騷不常曰春蘭。今秋菊乎。不又曰結幽蘭而延姱  
乎。不又曰疏石蘭以爲芳乎。若秋蘭既屬之澤蘭。將所  
云春蘭幽蘭石蘭者。又不得爲山蘭。當是何等之蘭乎。  
且山蘭爲花中最上之品。古今評者。列之梅菊之前。今  
反屈于孩兒菊之下。以爲盜襲其名。世間至賤之草。皆  
收入本草。獨山蘭清芬佳品。擯棄不錄。何其不幸。若斯  
之甚也。本草殺蠱之藥最多。皆未必有驗。至于行水消  
痰。固山蘭之葉力所優爲者也。蓋李時珍陳方吳楊輩  
皆泥定陳藏器以澤蘭蘭草爲一類二種。遂併騷經而

澤蘭町  
畦賤品  
幽字何  
可當也  
瀉血熱

疑之崇澤蘭而黜山蘭遂令蘭草無復有用之者不思  
若以爲一類則本經蘭草一條已屬重出何以本經蘭  
草反列之上品而澤蘭止爲中品乎况一入氣分一入  
血分迥然不同也又騷經言蘭者凡五除本蘭人所共  
識其餘秋蘭春蘭幽蘭石蘭若皆以爲孩兒菊是不特  
二種一類且四種一類矣而以爲九畹之姦誣理也  
哉蓋本經言澤蘭所以別乎山也言蘭草明用葉而不  
用其花也騷經言秋蘭所以別乎春也言石蘭所以別  
乎澤也愚謂秋蘭當屬澤蘭而春蘭石蘭定是山蘭其  
曰幽蘭則山蘭之別名以其生于深山窮谷故也寇氏  
朱氏之論又安可全非乎  
姑附愚說以諮多識之士

白微 苦鹹而寒陽明衝任之藥利陰氣下水氣主中風

身熱支滿忽忽不知人

陰虛火旺則內熱生厥火氣焚  
灼故身熱支滿痰隨火湧故不

人厥。汗出過多。血少。陽氣衝上。氣塞不行。而厥。婦人尤多此症。宜白微湯。白微當歸各一兩。參五錢。

并草錢半。熱淋。溫瘧。洗洗寒熱酸痛。能內營。故酸痛。每服五錢。

婦人傷中淋露。血熱。千金白微散。治胎前產後遺尿。不知時白微芍藥等分。酒調服。丹溪曰。此

卽河間所謂熱甚。廷孔鬱結。神無所依。產虛煩嘔。仲景

不能收禁之意也。廷孔。女人溺孔也。產虛煩嘔。安中

益氣竹皮丸。用之。經疏云。古方調經。種子。往往用之。益

不孕。緣于血熱。血少。而其源起于真陰不足。陽勝而內

熱。故營血日枯也。益陰清熱。則血自生旺。似牛膝。

有子矣。須佐以歸地芍藥杜仲從蓉等藥。

而短小柔軟。去髮酒洗用。惡大黃大戟山茱萸棗。

艾葉

苦辛生溫熱。純陽之性能回垂絕之元陽。通十

二經走三陰

太少理氣血

逐寒濕煖子宮止諸血溫中

開鬱調經安胎

胎動腰痛下血膠艾湯良阿膠艾葉煎服亦治虛癰

治吐衄崩帶

治帶

腹痛冷痢霍亂轉筋

皆理氣血逐寒濕之效

殺虻治癰

醋煎外科

有用乾艾作湯投白礬二三錢洗瘡然後敷藥者蓋以人血氣冷必假艾力以佐陽而艾性又能殺虫也

之灸

九音

火能透諸經而治百病血熱為病者禁用

灸火則氣

不行入藥則熱上衝不可過劑。丹出氣弱臍腹冷者以熟艾裝袋兜臍腹甚妙寒濕脚氣亦宜以此夾入襪

內

陳者良揉搗如綿謂之熟艾灸火用婦人丸散醋

煮搗餅用為末用

入茯苓數片同研則易細

煎服宜鮮者苦酒

醋香

宜活血  
利氣

附為使

艾附丸調婦人諸病宋時重湯陰艾自明成仙  
來則以蘄州艾為勝云灸酒壘一灸便透蒙聖

發明並以野艾為真  
斷艾雖香實非艾種

延胡索

辛苦而溫入手足太陰

脾厥陰

心包經能行血

中氣滯氣中血滯通小便除風痺治氣凝血結上下內

外諸痛

通則不痛

癥癖崩淋月候不調

氣血不和因而凝滯不以時至

產後

血運暴血上衝折傷積血疝氣危急為活血利氣第一

藥然辛溫走而不守

獨用力迅宜兼補氣血藥

通經墮胎血熱氣虛

者禁用根如半夏肉黃小而堅者良酒炒行血醋炒

通行血  
潤燥

止血生用破血炒用調血

紅花

古名紅藍花

辛苦甘溫入肝經而破瘀血活血。瘀行則

熱結于中暴吐紫黑血者吐出為好吐未盡潤燥消腫

加桃仁紅花行之大抵鮮血宜止瘀血宜行

止痛凡血熱血瘀治經閉便難血運口噤胎死腹中非

血行血痘瘡血熱本陣不喉痺不通又能入心經生新

血須兼補血俗用染紅併作胭脂胭脂活血解毒

傳之少用養血多則行血過用能使血行不止而癸生

于心包藏于肝屬于衝任紅花汁與相類故治血痛有

產婦血悶而死者名醫陸氏以紅花數十斤煮湯寢婦

草  
延胡索  
紅花  
七

上而薰之湯冷再加半日而蕪金匱有紅藍花酒云治婦人六十二種風

通行血

茜草 色赤入營氣溫行滯味酸走肝而鹹走血本經入

厥陰血分心包能行血止血能行故能止消瘀通

通經酒煎一兩治風痺黃疸疸有五黃疸穀疸酒疸黃

黃不專于濕熱者也女勞疸必屬腎虛亦不可以濕熱

例治當用四物知柏壯其水參木培其氣隨症而加利

濕清熱藥崩運撲損痔瘻瘡癰血少者忌用 根可染絳忌

滯血熱 滯腸

紫草 甘鹹氣寒入厥陰血分心包涼血活血利九竅通

二便。鹹寒。性滑。治心腹邪氣。即熱也。水腫。五疸。癰癤。惡瘡。血熱所致。

及痘瘡。血熱毒盛。二便閉澹者。血熱則毒閉。得紫草涼之。則血行而毒出。大便

利者忌之。活幼心書云。紫草性寒。小兒脾實者可用。脾虛者反能作瀉。古方惟用茸。取其初得陽氣。以類觸類。

用發痘瘡。今人不達此理。一槩用之。誤矣。瀉者忌用。去頭鬚酒洗。

瀉血熱。  
凌霄花。一名紫葳。其酸而寒。入厥陰血分。心包。能去血中伏

火。破血去瘀。主產乳餘疾。崩帶。癥瘕。腸結。便不大。血閉淋

悶。風痒。血熱生風之症。女科多用。孕婦忌之。本經云。養胎。經疏云。

被血之藥。非所宜也。○肺癰有用之。為君藥者。凌霄花為末。和蜜陀僧。唾調熬酒。驢甚驗。藤生花。

本草。卷之八。茜草。紫葳。凌霄花。



瀉涼血

開五瓣黃赤有點不可近鼻聞傷腦

大小薊

其溫

大明日涼

皆能破血下氣行而帶補治吐衄腸

癰女子赤白沃安胎

涼血之功

小薊力微能破瘀生新葆精

養血退熱補虛不能如大薊之消癰腫

丹溪曰小薊治下焦結熱血淋

本事方一人冷氣入陰囊腫滿疼痛煎大薊汁服立瘥

兩薊相似花如髻大薊

莖高而葉皺小薊莖低而葉不皺皆用根

三七

亦名山漆

其苦微溫散血定痛治吐血衄血血痢血崩

目赤癰腫

醋磨塗即散已破者為末慘之

為金瘡杖瘡要藥

杖時先服一二錢則

湯散癰  
定痛

血不衝心杖後敷之去瘀消腫易愈  
大抵陽明厥陰血分之藥故治血病  
此藥近時始出

軍中恃之從廣西山洞來者略似白及地黃有節味微

甘頗似人參以末摻猪血中血化為水者真  
近出一種葉似菊艾

而勁厚有岐尖莖有赤稜夏秋開黃花  
葉如金絲盤紐可愛而氣不香根大如牛蒡  
味甘極易繁衍云是三七

治金瘡折傷血病甚  
効與南中來者不同

滌止血

地榆 苦酸微寒性沉而瀉  
本草未嘗言瀉然能收入下

焦除血熱治吐衄崩中  
血虛腸風血鮮者為腸風隨感

毒積久而發也糞前為近血  
出腸胃糞後為遠血出肺肝  
蘇頌曰古方斷下後

蘇頌著  
本草圖

本草綱目  
卷土 大小 三七 地榆 九

經

生滑行  
血炒濟  
止血

瀉痢及初起者忌用

似柳根外黑裏紅取上截炒黑用稍反行

血得髮良惡麥冬

蒲黃 甘平厥陰血分藥心包生用性滑行血消瘀通經

脉利小便祛心腹膀胱寒熱同五靈脂治心腹療撲打

損傷瘡癰諸腫一婦舌脹滿口以蒲黃頻搽比曉乃愈

等分搽之愈時珍曰觀此則蒲黃之涼血活血可知矣

蓋舌為心苗心包相火乃其臣使得乾薑是陰陽相濟也炒黑性溫止一切血崩帶泄精香蒲花中葢屑湯

成入藥

生傷行  
血灸

止血

破血

行水  
散血

卷柏 生用辛平破血通經治癥瘕淋結灸用辛溫止血

治腸風脫肛 生石上拳拳如鷄足俗呼萬年松凡使

鹽水煮半日井水煮半日焙用

蔞茹 辛寒有小毒蝕惡肉排膿血殺疥虫除熱痺破癥

瘕內經同烏鰂骨 根如萊菔皮黃肉白葉長微潤折

之有汁結實如豆一顆三粒甘草為使

菴藷子 苦辛微寒別錄入肝經血分行水散血散中有

補治陽痿經澁腰膝骨節重痛產後血氣作痛閃挫折

宜行氣  
解鬱滯  
涼血破  
瘀

傷。撲打方  
多用之。能制蛇。  
見之則爛。  
一葉似刺而薄。莖似艾而粗。莖

鬱金 辛苦氣寒純陰之品其性輕揚上行入心及包絡

兼入肺經涼心熱散肝鬱下氣破血行滯氣亦不損正氣破瘀血亦能生

新治吐衄尿血婦人經脈逆行經不下行上為吐衄諸症用鬱金末加韭汁薑

汁童便服其血自清血氣諸痛產後敗血攻心顛狂失

痰中帶血者加竹瀝血氣諸痛產後敗血攻心顛狂失

心顛多喜笑尚知畏懼症屬不寤狂多忿怒人莫能制  
症屬有餘此病多因驚憂痰血塞于心竅所致鬱金  
七兩白礬三兩米糊丸服名白金丸毒入心鬱金一  
鬱金入心散惡血明鬱化頑痰故也

破血  
行氣

二錢半。煮乾焙研末。冰片五分。每用一錢。加猪血五七  
滴。新汲水下。治疔疽。始有白泡。忽搐入腹。紫黑無膿。

下蠱毒。同升麻服。出川廣體鏡。圓如蟬肚。外黃內赤。  
不吐則下。

色鮮微香。味苦帶甘者真。市人多以  
薑黃偽之。

薑黃 苦辛。本草大寒。藏色黃入脾。兼入肝。經理血中之  
器。大明曰熱。

氣下。氣破血。除風消腫。功力烈于鬱金。治氣脹血積。產

後敗血。攻心通月經。療撲損。片子者。能入手臂。治風寒

濕痺。血虛臂痛者。勿用。時珍曰。人臂出川廣。陳藏器  
治痛。其兼理血中之氣可知。

苦寒。色赤。薑黃辛溫。色黃。莖味苦。色青。三物不同。所用  
各別。經疏曰。薑黃主治介乎三稜鬱金之間。時珍曰。薑

破血  
行氣消  
積

黃同奔

之重

分二

黃鬱金莪述形狀功用大畧相近但鬱金入心專治血  
薑黃入脾兼治血中之氣述入肝治氣中之血稍為不  
同今時以扁如乾薑者為片子薑黃圓如蟬腹者為  
蟬肚鬱金並可染色述形雖似鬱金而色不黃也

莪述

音

辛苦氣溫入肝經血分破氣中之血

能通肝  
消

瘀通經開胃化食解毒止痛治心腹諸痛冷氣吐酸奔

豚疝癖

酒醋磨服瘕音賢小腹積瘕癖多見于男子瘕

治積聚諸氣良按五積心積曰伏梁起臍上至心下肝  
積曰肥氣在左脇肺積曰息食在右脇脾積曰痞氣在  
胃脘右側腎積曰奔豚在小腹上至心下治之不宜端  
用下藥恐損真氣宜于破血行氣藥中加補脾胃藥氣  
旺方能磨積正旺則邪自消也經曰大積大聚其可犯  
也衰其大半而止過者死東垣五積方用三棱莪述皆

瀉行氣  
破血消  
積

兼人參贊助成功。按治積諸藥。神麴麥芽化穀食。萊服  
化麵食。硃砂阿魏山查化肉食。紫蘇化魚蟹。毒葛花枳  
椶消酒積。麝香消酒積。菓積。牽牛芫花大戟行水飲。三  
稜莪朮。鯨甲消癥瘕。木香檳榔行氣滯。礞石蛤粉攻痰  
積。巴豆攻冷積。大黃芒硝攻熱積。雄  
黃膩粉攻涎積。蟲出水蛭攻血積。雖為泄劑。亦能益  
氣。王好古口。故治氣短不能接續。大小  
七香丸。集香丸。諸湯散中多用之。根如生薑茂

生根下似卵不齊。堅硬難擣。灰火煨透。乘熱擣之。入氣分

或醋磨酒磨。或煮熟用。入血分

荊三稜。苦平。色白。屬金。皮黑肉白。入肝經。血分。破血中之氣。

亦通肝。兼入脾經。散一切血瘀。氣結。瘡硬。食停。老塊。堅



瀉火補血  
中止血  
止藏

積。乃堅者削之。從血藥則治血。從氣藥則治氣。須輔以  
健脾補氣藥。良昔有人患癥瘕死。遺言開腹取之。得  
病塊如石。文理五色。削成刀柄。因刈消腫止痛。通乳墮  
三稜。柄消成水。乃知此藥可療癥瘕。胎功近香附而力峻。虛者慎用。色黃體重若鯽魚而  
小者良。醋浸炒。或麴裹煨。

白茅根 其寒入手少陰。心足太陰陽明。胃脾補中益氣除。

伏熱消瘀血。利小便解酒毒。治吐衄諸血。心肝火旺。逼

血。肺火盛。則衄血。茅根其和血寒涼。血引火下降。故血

治之。撲損瘀血。搗汁服。名茅花湯。亦治鼻衄產淋。血  
閉寒熱。血瘀則閉。閉淋瀝崩中。血熱傷寒。臧逆。說文曰。

傷熱止

噦氣悟也東垣作肺熱喘急內熱煩渴黃疸水腫清火行水

乾嘔之甚者未是時珍曰良藥也世人以微而忽之惟事

苦寒之劑傷沖和之氣烏足知此哉

茅針潰癰癰

酒煮服一針潰一

孔二針潰二孔

蘆根 甘益胃寒降火治嘔噦反胃胃熱火升則嘔逆食不下金匱方蘆根煎

服消渴客熱傷寒內熱止小便數肺為水之上源脾氣散精上歸于肺始能

通調水道下輸膀胱腎為水藏而主二便三經有熱則小便數甚至不能少忍人性急速故也蘆中空故入心

肺清上焦熱熱解則肺之氣解魚蟹河豚毒取逆水

化行而小便復其常道矣  
肥厚者去鬚節用

濕熱散

濕熱

芩根 甘寒而滑補陰破瘀鮮熱潤燥治天行熱疾大渴

大狂胎動下血諸淋血淋搗貼赤遊丹毒癰疽發背金

瘡傷折止血雞魚骨哽搗如龍眼雞骨湯下汁能化血為

水芩皮與產婦作枕止血運安腹上止產後腹痛散瘀之功

濕芩汁療消渴

薔薇根 苦澀而冷入胃大腸經除風熱濕熱生肌殺重

治泄痢消渴牙痛口糜煎汁含漱遺尿好眠癰疽瘡癰花

有黃白紅紫數色以黃心白色粉紅者入藥子名營實

熱

大瀉血  
分實熱  
下有形  
積滯

酸溫主治畧同

千金曰薔薇根角蒿口瘡之神藥角蒿所在多有開淡紅紫花角微彎長二寸

許辛苦有小毒治惡

瘡有虫及口齒瘡

芭蕉根 味甘大寒治天行熱狂煩悶消渴產後血脹並

汁塗癰腫結熱為末油調傳服霜後者佳

大黃 大苦大寒入足太陰脾手足陽明厥陰大腸胃血

分其性浮而不沉其用走而不守若酒浸亦能引至至

高之分

仲景太陽門調胃承氣湯大黃註曰酒洗少陽陽明小承氣

湯大黃不用酒製皆有分別東垣曰邪氣在上非酒不

至若用生者則遺至高之邪熱病愈後或目赤喉痹頭

草

薔薇根芭蕉根大黃

腫膈上熱疾生也用以蕩滌腸胃下燥結而除瘀熱治傷寒時

疾發熱譫語大腸有燥糞故譫語宜下之溫熱瘴瘵下痢赤白腹

痛裏急黃疸水腫癥瘕積聚積久成形謂之積屬陰聚散無常謂之聚屬陽積多

是血或食或痰聚多是氣留飲宿食心腹痞滿二便不通皆土鬱吐

血衄血血閉血枯損傷積血一切實熱血中伏火行水

除痰蝕膿消腫能推陳致新然傷元氣而耗陰血下多亡陰

若病在氣分虛血弱人禁用病在氣分而用之是為誅伐無過東垣曰能推

陳致新如定禍亂以致太平所以有將軍之號時珍曰仲景瀉心湯治心氣不足吐衄血者用大黃黃連黃芩

臍音嘖

乃瀉心包肝脾胃四經血中之伏火也。又治心下痞滿。按之軟者。用大黃黃連瀉心湯。亦瀉脾胃之濕熱。非瀉心也。病發于陰而反下之。則痞滿乃寒傷營血邪結上焦胃之上脘當心。故曰瀉心。經曰太陰所至爲痞滿。又曰濁氣在上則生腹脹。是已病發于陽而反下之。則結胸。乃熱邪陷入血分亦在上脘。故大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而降其濁氣也。若結胸在氣分只用小陷胸湯痞滿在氣分只用半夏瀉心湯。或問心氣不足而吐衄何以不瀉心而反瀉心。丹溪曰少陰不足元陽無輔致陰血妄行。故用大黃瀉其亢甚之火。又心本不足肺肝各受火邪而病作。故用黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血之合也。肺肝火退則血歸經而自安矣。寇宗奭曰以苦泄其熱就以苦補其心。蓋一舉而兩得之。李士材曰古人用大黃治虛勞吐血意甚探微。蓋濁陰不降則清陽不升瘀血不去則新血不生也。

川產錦紋者良有

瀉火除

酒浸酒蒸生熟之不同生用更峻黃芩為使欲取通利者不得驟

進穀食大黃得穀食便不能通利耳夷堅志湯火傷者搗生大黃醋調敷止痛無癢

黃芩 苦入心寒勝熱瀉中焦實火除脾家濕熱治泄痢

腹痛使血日微寒痛忌用凡腹痛有寒熱虛實食積瘀血痰濕之不同寒宜溫熱宜清虛宜補實宜下食

宜消導瘀血宜行散痰濕宜化痰利濕痛時手不可按者為實痛按之痛止者為虛痛寒熱往來

邪在少陽黃疸五淋血閉實熱在血分氣逆癰疽瘡瘍及諸失血

消痰丹溪曰黃芩降痰假其降火也按痰因火動當先降火利水鮮為安胎胎孕宜清

熱涼血血不妄行則胎安養陰退陽補膀胱水酒炒則上行瀉肺火

利胸中氣

肺主氣熱傷氣  
寫熱所以保肺

治上焦之風熱濕熱

升溪曰  
黃芩上

中二焦藥

火嗽喉腥

五臭肺  
為腥

目赤腫痛過服損胃血虛寒中

者禁用

得柴胡退寒熱得芍藥治痢得厚朴黃連止腹  
痛得桑皮瀉肺火得白朮安胎之聖藥時珍曰

仲景治少陽症小柴胡湯太陽少陽合病下利黃芩湯  
少陽症下後心滿瀉心湯並用之蓋黃芩苦寒入心瀉  
熱除脾家濕熱使胃火不流入肺不致刑金即所以保  
肺也肺虛不宜者苦寒傷土損其母也少陽症雖在半  
表半裏而胸膈痞滿實兼心肺上焦之邪心煩喜嘔默  
然不欲食又兼脾胃中焦之症故用黃芩以治手足少  
陽相火黃芩亦少陽藥也楊士瀛曰柴胡退熱不及黃  
芩時珍曰柴胡乃苦以發之散火之標也黃芩乃寒能  
勝熱折火之本也東垣治肺熱身如火燎煩躁引飢而  
晝盛者宜一味黃芩湯以瀉肺經氣分之火黃芩一兩



濕火燥

煎服。本事方用  
治崩中暴下。

黃明者良。中虛者名枯。芩即片芩。瀉

肺火清肌表之熱。內實者名條芩。即子芩。瀉大腸火。補

膀胱水。上行酒炒。瀉肝胆火。猪胆汁炒。山茱龍骨為使。

畏丹皮丹砂。

黃連。大苦大寒。入心瀉火。王海藏曰。瀉心實瀉。脾也。實則瀉其子。鎮肝涼

血。凡治血防風為上部之使。黃連為中部之使。地榆為下部之使。燥濕開鬱。解渴。單用能治

清。除煩。益肝胆。厚腸胃。消心痰。能去心竅惡血。止盜汗。涼心治腸

瀉瀉痢。便血曰瀉。有藏連丸。濕熱鬱而為痢。黃連治痢。要藥禁口者熱壅上焦。同人參煎湯呷之。但得

下咽便好。喻嘉言曰：下痢必先汗解其外，後調其內。首用辛涼以解表，次用苦寒以攻裏。稅要云：後重宜下，腹痛宜利，身重宜除濕，脉弦宜去風。風邪內結，宜汗身冷，自汗宜溫，膿血稠粘宜重劑以竭之。下痢赤屬血分，白屬氣分。戴氏曰：俗謂赤熱白寒者，非也。痞滿、燥、微、開、鬱、通作熱，熱處治，但有新久虛實之分。痞滿、仲景治九種心下痞，五等腹痛。清心、痛、伏、梁、積、目、痛、背、傷、入、乳、浸、瀉、心、湯、皆用之。熱、心、痛、伏、梁、積、目、痛、背、傷、入、乳、浸、瀉、心、湯、皆用之。歸芍等分煎湯，癰疽、瘡、疥、諸痛、癢、癰、酒、毒、胎、毒、小兒初熱洗散，熱活血。草為末，蜜明目。傳信方：羊肝一具，黃連一兩，搗定，驚風調令嚙之。明目。凡眼目疾皆治。名羊肝丸。止汗、鮮、毒、除、疳。同猪肚蒸為丸。殺、虻、虻、得、苦、虛、寒、為、病、者、禁、用。久服黃連，連苦參反熱，從火化也。昂按：炎上作苦，味苦必燥，燥則熱矣。且苦寒沉陰，肅殺伐傷生和之氣也。韓元

日黃連與肉桂同行能交心腎于頃刻時珍曰治痢用  
香連丸黃連丸用黃連乾薑薑黃散用黃連生薑左金  
丸用黃連吳茱萸治口瘡用黃連細辛止下血用黃連  
大蒜一陰一陽寒因熱用熱因寒用最得製方之妙

出宣州者粗肥出四川者瘦小狀類鷹爪連珠者良

去毛治心火生用虛火醋炒肝胆火猪胆汁炒上焦火

酒炒

有吞酸嘈雜等症亦有吐酸者名酢心宜黃連吳茱萸降火開鬱酢音醋

中焦火薑汁

炒下焦火鹽水或童便炒食積火黃土炒治濕熱在氣

分吳茱萸湯炒在血分乾漆水炒點眼赤人乳浸

時珍曰諸

法不獨爲之引導蓋辛熱制其苦寒鹹寒制其燥性川者詳之黃芩龍骨爲使惡菊花

驚風

玄參、廬蚕、白鮮皮、畏欬冬、牛膝、忌猪肉。時珍曰：方有連九，黃連省用。

九、豈忌肉而殺鳥頭巴豆毒。黃連瀉心火，佐以龍胆瀉肝，胆火自芎藭瀉脾，脾火石膏瀉胃，火知母瀉腎，火黃柏瀉膀胱，火木通瀉小腸，火黃芩瀉肺，火梔子佐之瀉大腸，火黃連佐之柴胡瀉肝，胆

火黃連佐之瀉三焦，火黃芩佐之。鄭真一曰：然鬱惡心兀兀欲吐，用黃連數分甚效。

胡黃連 苦寒去心熱，益肝胆，厚腸胃，治骨蒸勞熱，五心

煩熱。心窩手三消。渴而多飲為上消，肺熱也；心移熱于肺，傳為消渴是也；多食善飢為中消，胃熱也；痺成痼，中是也；渴而小便數，有膏為下消，腎熱而水虧也。五痔。牝痔、牡痔、脉痔、

下流傷血，分無所施，視溫瘧、瀉痢、女人胎蒸、消菓子積、

則逼肛門而為痔腫。

大黃、黃連、甘草、胡黃連。

本草綱目卷二 胡黃連

本草綱目卷之二十一

為小兒驚癇良藥。朱二九日解吃烟毒合茶服之甚効。性味功用似黃

連故名出波斯國今秦隴南海亦有之心黑外黃折之

塵出如烟者真畏惡同黃連

瀉火燥  
濕補陰

苦參 苦燥濕寒勝熱沉陰主腎補陰益精養肝胆安五

藏。濕熱去則血氣和。利九竅生津止渴明目止淚。痰為

治溫病血痢。純下清血者風傷肝也宜散風涼血。腸風

溺赤黃疸酒毒熱生風濕生虫又能祛風逐水殺虫治

大風疥癩然大苦大寒肝腎虛而無熱者勿服。張從正曰凡藥

藥能醫 病不能 養人食 能養人 不能醫 病 水潤燥 滋火補 滑腸

皆毒也。雖苦參其草不可不謂之毒。久服必偏勝為患。經曰：五味入胃，各歸其所喜攻。久而增氣，物化之常也。氣增而久，天之由也。王冰註曰：氣增不已，則藏有偏勝。偏勝則藏有偏絕，故令人暴天。筆談云：久用苦參擦牙，遂病腰痛，由其氣傷腎也。經又曰：大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；無毒治病，十去其九。穀肉菓菜食養盡之，無使過之，傷其正也。按人參補脾，沙參補肺，紫參補肝，丹參補心，玄參補腎。苦參則苦腎命門之藥，不在五參之內。然名參者皆補。糯米泔浸去腥氣，蒸用玄參為使，惡

貝母、兔絲子、漏蘆、反藜蘆。苦參一兩，或酒煎，或醋煮，能吐天行時毒。

知母 辛苦寒滑。上清肺金而瀉火。瀉胃熱，勝膀胱邪。下潤

腎燥而滋陰。入二經氣分。黃柏入二經血分，故消痰定

嗽止渴安胎

莫非清火之用

治傷寒煩熱瘧勞

產骨蒸退有汗

燥渴虛煩久瘧下痢

治嗽者清肺火也治渴者清胃火也退骨蒸者瀉腎火也利二

便消浮腫

小便利則腫消東垣曰熱在上焦氣分便閉而渴乃肺中伏熱不能生水膀胱絕其化源

東垣治便秘以  
利不渴  
分之

宜用淡滲之藥瀉火清金滋水之化源熱在下焦血分便閉而不渴乃真水不足膀胱乾涸無陰則陽無以化宜用黃柏知母大苦寒之藥滋腎與膀胱之陰而陽自化小便自通丹溪曰小便不通有熱有濕有氣結于下宜清宜燥宜升又有隔二隔三之治如肺不燥但膀胱熱宜瀉膀胱此正治如因肺熱不能生水則清肺此隔二之治如因脾濕不運而精不上升故肺不能生水則燥胃健脾此隔三之治瀉膀胱黃柏知母之類清肺車前茯苓之類燥脾二术之類昂按凡病皆有隔二隔三之治不獨便閉也然苦寒傷胃而滑

瀉肝胆  
火下焦  
濕熱

腸多服令人瀉。李士材曰。苦寒肅殺。非長養萬物者也。世以其滋陰施之。虛損之人。如水益深。  
矣。特表出。  
以為戒。  
得酒良。上行酒浸。下行鹽水拌。忌鐵。

龍膽草

太苦大寒。沉陰下行。益肝膽而瀉火。

相火寄于肝胆。有瀉

無補瀉其邪熱。即所以補之也。兼入膀胱腎經。除下焦之濕熱。與防已

同功。酒浸。亦能外行。上行治骨間寒熱。

腎主骨。驚癇邪氣。

肝經時氣溫熱。熱痢。疸黃。寒濕脚氣。

足傷寒濕。則成脚氣。腫而痛者。為濕

脚氣宜清熱利濕。搜風。又有攣縮枯細。

咽喉風熱。赤睛。

努肉。

瀉肝胆火。能明目。且元素曰。柴胡為主。龍膽為使。目疾要藥。昂按。若目疾初起。宜發散。忌用寒涼。



瀉肝散  
夢火

疽瘡疥過服損胃  
甘草水浸一宿暴用小豆貫衆為  
使惡地黃

青黛 鹹寒色青瀉肝散五藏鬱火餅中下焦蓄蘊風熱

衍義曰一婦患臍腹二陰遍生濕瘡熱痒而痛出黃汁  
二便澁用鰻鱺松脂黃丹之類塗之熱痛愈甚其婦嗜  
酒喜食魚蝦發風之物乃用馬齒莧四兩研爛入青黛  
一兩和塗熱痛皆去仍服八正散而愈此中下焦蓄蘊  
風熱毒氣若不出當作腸風內  
痔婦不能禁酒物果仍發痔  
陰虛火炎者忌用合杏仁研置  
柿餅中煨食名聖餅子治咯血  
小兒驚癇疳熱丹熱傳

癰瘡蛇犬毒 卽靛花取嬌碧者水飛淨用  
內多石灰故須淘淨

熱毒

大青 微苦鹹大寒解心胃熱毒治傷寒時疾熱狂陽毒

發斑熱甚傷血裏實表虛則發斑輕如疹子重如錦紋紫黑者熱極而胃爛也多死活人治赤斑煩痛有

犀角大黃疸熱痢丹毒喉痺處處有之高二三尺莖

圓葉長葉對節生八月開小紅花成簇實大如椒色赤

用莖葉

大濕氣分濕熱

牽牛 辛熱有毒屬火善走入肺經瀉氣分之濕熱肺主

能平金而泄肺能達右腎命門走精隧通下焦鬱滯及大腸風

秘氣秘利大小便逐水消痰殺虫墮胎治水腫喘滿痰

癖氣塊若濕熱在血分胃弱氣虛人禁用

東垣曰牽牛苦寒誤矣其

味辛辣久嚼猛烈雄壯所謂苦寒安在哉乃瀉氣之藥比諸辛藥泄氣尤甚若濕從下受下焦主血血中之濕宜苦寒之味而反用辛熱之藥泄上焦之氣是血病瀉氣使氣血俱損也王好古曰以氣藥引則入氣以大黃引則入血時珍曰一婦腸結年幾六十服養血潤燥藥則泥膈服硝黃藥則若罔知如此三十餘年其人體肥膏粱而多鬱日吐酸痰乃寬此乃三焦氣滯有升無降津液皆化為痰不能下潤腸腑非血燥也潤劑留滯硝黃入血不能入氣故無効川牽牛爲末皂角膏丸緩服便通外甥素多酒色病二便不通脹痛呻吟七晝夜用通利藥不効予思此乃濕熱之邪在精道壅隧路病在二陰之間故前阻小便後阻大便病不在大腸膀胱也用棟實茴香穿山甲諸藥倍牽牛三服而平東垣補下焦陽虛天眞升川牽牛鹽水炒黑佐沉香杜仲肉桂破

通行水  
濕下焦  
血分熱

故紙諸藥深得  
補瀉兼施之妙

有黑白二種黑者力速亦名黑丑取子淘

去浮者春去皮用得木香乾薑良此藥漢前未入本草故仲景方中無此別

錄始載之宋  
後始多用者

防已

大辛苦寒

本經平別錄溫太陽經藥

能行十二經通腠

理利九竅瀉下焦血分濕熱為療風水之要藥治肺氣

喘嗽

水濕熱氣諸痛降氣溫痺脚氣足傷寒濕為脚氣寒濕鬱而為熱濕則腫

熱則痛防已為主藥濕加苡仁蒼朮木瓜木通熱加苓

栝風加羌活草薢痰加竹瀝南星痛加香附木香活血

加四物大便秘加桃仁紅花小便秘加牛膝澤瀉痛連

臂加桂枝威靈仙痛連脇加胆草又有足跟痛者屬腎

本草綱目卷之二十一 木部

虛不與脚氣同論。水腫風腫癰腫惡瘡或濕熱流入十二經致

二陰不通者非此不可然性險而健陰虛及濕熱在上

本集以行水為焦氣分者禁用十劑曰通可去滯通草防已之屬是也

通劑改通與燥劑無以別矣木通其淡瀉氣分濕熱防已苦寒瀉血分濕熱出漢中根大而虛

燥劑

通心有花紋色黃名漢防已黑點黃腥木强者名木防

已不佳陳藏器曰治風用木酒洗用惡細辛畏草薢

大醫氣開通行葶藶辛苦大寒屬火性急大能下氣行膀胱水肺中水

氣膈急者非此不能除被積聚癥結伏留熱氣消腫除

水

大通湯  
經水

痰止嗽定喘

水濕泛溢為腫脹為痰軟為喘滿

通經利便久服令人虛

十劑日洩可去閉葶藶大黃之屬是也天黃泄陰分血  
閉葶藶泄陽分氣閉氣味俱厚不減大黃然有甜若二  
種甜者性緩苦者性急泄肺而傷胃宜大棗輔之仲景  
有葶藶大棗瀉肺湯治肺氣喘急不得臥却按輔以大  
棗補上所  
以制水  
子如黍米微長色黃合糯米微炒去米用

得酒良榆皮為使

甘遂

苦寒有毒能瀉腎經及隧道水濕直達水氣所結

之處以攻決為用為下水之聖藥

仲景大陷胸湯用之

主十二種

水大腹腫滿

名水蠱喻嘉言曰胃為水穀之海五藏六府之源脾不能散胃之水精于肺而病于

腎者胃  
之關也  
前陰利  
水後陰  
利穀

中肺不能通胃之水道于膀胱而病于上。腎不能司胃  
之關。時其蓄泄而病于下。以致積水浸淫無所底止。王  
好古曰。水者脾肺腎三經所主。有五藏六府十二經之  
部分。上頭面中四肢下腰脚。外皮膚中肌肉內筋骨脉  
有尺寸之殊。浮沉之別。不可輕瀉。當知病在何經何藏  
方可用之。按水腫有痰聚食積瘀血致清不升。濁不降  
而成者。有濕熱相生。隧道阻塞而成者。有燥熱冲擊。秘  
結不通而成者。症屬有餘。有服寒涼傷飲食。中氣虛衰  
而成者。有大病後正氣衰憊而成者。有小便不通。水液  
妄行。脾莫能制而成者。症屬不足。宜分別治之。然其源  
多由中氣不足而起。丹溪曰。水病當以健脾為主。使脾  
實而氣運。則水自行。宜參苓為君。視所挾症加減。苟徒  
用利水藥。癰疽積聚留飲宿食痰迷癰癩虛者忌用。  
多致不救。

皮赤肉白根作連珠重實者良。麴裹煨熟用。

或用甘草  
薺萆汁浸

大戟  
通水  
濕

三日其水如墨以瓜蒂為使惡遠志反甘草仲景治心清為度再麵裹煨甘草同用取其相反以立功也有治水腫及腫毒者以甘草末傅腫處濃煎甘草湯服之其腫立消二物相反感應如此

大戟 苦寒有毒能瀉藏府水濕行血發汗利大小便治

十二水腹滿急痛積聚癥瘕頸腋癰腫風毒脚腫通經

墮胎誤服損真氣

時珍曰痰涎為物隨氣升降無處不到入心則迷或癰癩入肺則塞竅為

咳喘背冷入肝則脇痛乾嘔寒熱往來入經絡則麻痺疼痛入筋骨則牽引隱痛入皮肉則瘰癧癰腫陳無擇並以控涎丹主之殊有奇効此乃治痰之本痰之本水也濕也得氣與火則結為痰大戟能泄藏府水濕甘草



能行經絡水濕白芥子能散皮裏膜外痰氣惟善用者能收奇功也又口錢仲陽謂腎為真水有補無瀉復云痘症變黑歸腎者用百祥膏下之非瀉腎也瀉其府則藏自不實府者膀胱也百祥惟大戟一味能行膀胱之水故也竊謂非獨瀉府乃腎邪實而瀉肝也實則瀉其子大戟浸水青綠肝胆之色也痘症毒盛火熾則水益涸風挾火勢則土受虧故津液內竭不能化膿而成果焰之症瀉其風火之毒所以救腎扶脾也昂按瀉心乃所以補心瀉腎即所以救腎邪熱退則真陰復矣稅要用大戟一兩棗三枚同煮焙乾去戟用棗九服名棗變丸  
杭產紫者為上北產白者傷人漿水煮去骨用

得大棗則不損脾畏苘蕒反甘草

商陸 苦寒有毒 諸家辛酸 沉陰下行與大戟甘遂同功

水 大通行

時珍苦寒

療水腫脹滿。

腫屬脾。脹屬肝。腫則陽氣。腫行如單脹而

寬暮急為血虛。

暮寬朝急為氣虛。朝暮俱急為氣血兩

虛。腫脹由心腹而散四肢者吉。由四肢而入心腹者危。

男自下而上。女自

上而下。皆難治。

瘕疝癰腫喉痺不通。薄切醋炒。良濕熱

之病。瀉蠱毒。傳惡瘡。墮胎孕。令人見鬼神。取花白者。

根。

赤者傷人。只堪貼臍。入麝三分搗貼。小便利則腫消。

黑豆湯浸。蒸用。得蒜良。

芫花

苦溫有毒。去水飲痰癖。療五水在五藏皮膚。脹滿。

喘急。痛引胸脇。咳嗽。瘰癧。

五水者。風水。皮水。正水。石水。黃汗也。水積胞中。堅滿如石。

名石水。汗如柏汁。名黃汗。久不愈。必致癰膿。時珍曰。仲

景治傷寒太陽症。表未解。心下有。水而咳。乾嘔發熱。或

喘或利者。小青龙湯主之。表已解。有時頭痛。出汗惡寒。心下有。水乾嘔。痛引兩脇。或喘或咳者。十棗湯主之。蓋青龍散表邪。使水從汗出。內經所謂開鬼門也。十棗逐裏邪。使水從二便出。內經所謂潔淨府。去陳莖法也。十棗湯。芫花甘遂大戟等分。棗十枚。

葉似柳。二月開花。紫碧色。葉生花落。陳久者良。醋煮過。水浸暴用。根療疥。可毒魚。反甘草。

翻訟者。取葉擦皮膚。輒作赤腫。假傷以誣人。

蕘花 辛散結。苦洩熱。行水提藥。主治畧同芫花。

大通行水  
通水

澤漆 辛苦微寒。消痰退熱。止嗽殺虫。利大小腸。治大腹

水腫。益丈夫陰氣。生平澤。葉圓黃綠。頗類貓睛。一名

宜吐痰  
截瘧逆  
行水

貓兒眼睛草莖中有白汁粘人。李時珍曰別錄云是大戟苗非也功相類爾

常山

辛苦而寒有毒能引吐行水祛老痰積飲

痰有六風痰寒

痰濕痰熱痰食痰氣痰也飲有五流于肺為支飲于肝為懸飲于心為伏飲于經絡為溢飲于腸胃為痰飲也常山力能吐之下之專治諸瘧然悍暴能損真氣弱者慎用。時珍曰常

山蜀漆劫痰截瘧須在發散表邪及提出陽分之後用之瘧有經瘧藏瘧風寒暑濕痰食瘴鬼之別須分陰陽虛實不可槩論常山蜀漆得甘草則吐得大黃則利得烏梅穿山甲則入肝得小麥竹葉則入心得秫米麻黃則入肺得龍骨附子則入腎得草薢檳榔則入脾蓋無痰不作瘧一物之功亦在驅逐痰水而已李士材曰常山發吐唯生用多用為然與甘草同用亦必吐若酒浸炒透但用錢許每見奇功未見其或吐也世人泥于雷

教老人久病忌服之說使良藥見疑沉痾難起抑何愚耶○常山吐瘧痰瓜蒂吐熱痰烏附尖吐濕痰萊菔子吐氣痰藜蘆吐風痰雞骨者良酒浸蒸或炒用栝蒌爲使忌蔥

茗莖葉名蜀漆功用畧同

古方有蜀漆散取其苗性輕揚發散上焦邪結甘草

水拌蒸

吐

藜蘆 辛寒至苦有毒入口卽吐善通頂令人噦風癰症

多用之

張子和曰一婦病風癰初一二年一作後漸日作甚至一日數作求死而已值歲大飢采百草

食見野草若蔥采蒸飽食覺不安吐膠涎數日約一二斗汗出如洗甚昏困後遂輕健如常人以所食蔥訪人乃憇蔥苗卽藜蘆是矣李時珍曰和王如年七十中風不省牙關緊閉先考太醫吏日月池翁診視藥不得入

輕通行  
水瀉小  
腸火

不獲已打去一齒濃煎藜蘆湯灌之少頃噫  
氣遂吐痰而甦藥不瞑眩厥疾不瘳誠然  
取根去

頭用黃連為使反細辛芍藥諸參惡大黃畏蔥白  
服蔥

湯即止

木通

古名  
通草

甘淡輕虛上通心包降心火清肺熱心火降  
則肺熱

清化津液肺為水源肺熱清則津液化水道通  
下通大小腸膀胱導諸濕

熱由小便出故導赤散用之凡利小便不多不利大便  
以小便愈通大便愈燥也木通能入大腸

兼通通利九竅血脈關節治胸中煩熱遍身拘痛  
楊仁齋云

遍身隱熱疼痛拘急足冷皆伏熱傷血血  
大渴引飲中焦

本草備要 卷上 藜蘆木通  
主

寒水太  
陽膀胱  
也

火淋瀝不通。下焦火。心與小腸相表裏。水腫浮大。利小便。

耳聾。泄腎火。目眩。口燥。舌乾。舌為心苗。喉痺。咽痛。上焦鼻鼾。

音蹇。熱擁清道。失音。金。脾疸好眠。脾主四肢。倦則好眠。則氣窒不通。心為脾母。心熱清則。

脾熱除煩退熱止痛排膿破血催生行經下乳。火不亢。亦除。子內氣。

順血行故經調。汗多者禁用。東垣曰。肺受熱邪。津液氣。有準。乳汁循常。化之源絕。則寒水斷流。膀胱受濕熱。癰閉約束。則小便不通。宜此治之。朱二九日。

火在上。則口燥。眼赤。鼻乾。在中。則心煩。嘔噦。浮腫在下。則淋閉。足腫。必藉此甘平之性。瀉諸經之火。火退。則小便自利。便利。則諸經火邪皆從小水而下。降矣。○君火。

宜木通。相火宜澤瀉。籐有細孔。兩頭皆通。故通。利水雖同。所用各別。

經通利  
水退熱

通草

古名通  
脫木

色白氣寒體輕味淡氣寒則降故入肺經

引熱下行而利小便味淡則升故入胃經通氣上達而

下乳汁治五淋水腫目昏耳聾鼻塞失音淡通竅寒降  
火利肺氣

退熱催生

通利水  
瀉膀胱  
火

澤瀉 甘淡微鹹入膀胱利小便瀉腎經之火邪功諦利

濕行水治消渴痰飲嘔吐瀉痢腫脹水痞脚氣疝痛淋

瀝陰汗有汗尿血洩精既利水而又止洩精何也此乃  
濕熱為病不為虛滑者言也

滑則當用補澁之藥濕熱之病濕熱既除則清氣上行又能養五



藏益氣力。起陰氣。補虛損。止頭旋。有聰耳明目之功。脾

有濕熱。則頭重耳鳴。目昏。滲去其濕。則熱亦隨去。土乃得令。而清氣上行。故本經列之上品。云聰耳明目。而六

味丸用之。今人多服昏目。小便過利。而腎水虛。故也。眼

多以昏目疑之。多服昏目。中有水屬膀胱過利。則水涸而火生。仲景八味丸用澤瀉。寇宗奭謂其接引桂附入

腎經。李時珍曰。非接引也。乃取其瀉膀胱之邪氣也。古

人用補藥。必兼瀉邪。邪去則補藥得力。一闔一闢。此乃玄妙。後人不知此理。而一于補。必致偏勝之患。矣。王履

曰。地黃山茱萸茯苓丹皮皆腎經藥。桂附右腎命門之藥。何待接引乎。錢仲陽謂腎為真水。有補無瀉。或云。脾虛

腎旺。故瀉腎扶脾。不知腎之真水不可瀉。瀉其伏留之邪耳。易老云。去脾中留垢。以其微鹹能瀉伏水故也。昂按六味丸有然地之溫。丹皮之涼。山藥之瀉。茯苓之滲。山茱之收。澤瀉之瀉。補腎而兼補脾。有補而必有瀉。相

腎惡燥  
故兼補  
為難

通行水  
瀉熱涼  
血

和相濟以成平補之功。乃平淡之神奇。所以為古今不  
易之良方也。即有加減。或加紫河車一具。或五味麥冬。  
杜仲牛膝之類。不過一二味。極三四味而止。今人或疑  
澤瀉之瀉而減之。多揀本草補藥。恣意加入。有補無瀉。  
且客倍于主。責成不專。而六味之功反退。處于虛。  
位失製方配合之本旨矣。此近世庸師之悞也。

鹽

水拌。或酒浸用。忌鐵。

車前草 甘寒涼血去熱止吐衄消癰瘰。明目通淋。凡利

水之

劑多損于目。惟此能解肝與小腸之熱。濕熱退而目清矣。雷擊日使葉勿使莖盡。子甘寒清。

肺肝風熱滲膀胱濕熱利小便而不走氣與茯苓同功。

強陰益精令人有子。腎有二竅。車前子能利水竅。而固

精。寢精盛則有子。五子衍宗丸用。

車前草

二車前草

三

輕通利  
水清熱

之枸杞兔絲各八兩五味覆盆各四兩車前二兩蜜丸  
慣遺洩者車前易蓮子時珍曰入服食須佐他藥如六  
味丸之用澤瀉可也若單用則過泄治濕痺五淋暑濕瀉痢  
能愈夫人云市有藥三文一貼甚効公不肯服夫人雜  
他藥進之一服而愈問其方乃車前子為末米飲下二  
錢七云此藥利水而不動氣水自赤障翳能除催生下  
逆利則清濁分谷藏自止矣

胎酒蒸搗餅焙研酒蒸搗餅入滋補藥炒研入利水泄瀉藥

燈草 甘淡而寒降心火心能清肺熱利小腸相表裏心

火清則肺清小腸亦通氣止血治五淋水腫燒灰吹喉

痺塗乳止夜啼擦癰最良縛成把擦摩極癢時重從草出浮水可見十餘次能斷根

通利小便  
破血

瞿麥 苦寒降心火利小腸逐膀胱邪熱為治淋要藥八

正散用之五淋大抵皆屬濕熱熱淋者八正及山梔滑石之類血淋宜小蓳牛膝膏腎虛淋宜補腎不可獨為老人氣虛者宜參朮帶木通山梔亦有痰滯中焦作淋者宜行痰兼通利藥最忌發汗汗之必便血破血利痰決癰消腫明目去翳通經墮胎性利善下虛者慎

用寇宗奭曰心經雖有熱而小腸虛者服之則心熱未清而小腸別作病矣 花大如錢紅

白斑爛色甚妖媚俗呼洛陽花用葶藶丹皮為使惡蠱

蛸產後淋當去血 麥產後淋當去血 黃皆為要藥

扁蓄 一名扁竹 苦平殺虫利小便治黃疸熱淋虻咬腹痛

通淋

八正散 瞿麥 扁蓄 燈草 瞿麥 扁蓄

虫蝕下部

煮服

葉細如竹弱莖蔓引促節有粉三月開

細紅花

天仙籐

苦溫疏氣活血治風勞腹痛妊娠水腫

有天仙籐散端

通活血消腫

治子腫

葉似葛圓而小有白毛根有鬚四時不凋

一云即青

木香

籐

地膚子

甘苦氣寒益精強陰入膀胱除虛熱利小便而

通利小便補陰

通淋

時珍曰無陰則陽無以化亦猶東垣治小便不通用知柏滋腎之意王節齋曰小便不禁或頻數古

方多以爲寒而用溫澁之藥殊不知屬熱者多蓋膀胱火邪妄動水不得寧故不能禁而頻數也故老人多頻

通淋補  
勞

螬蛸

數是膀胱血少陽火偏旺也治法當補膀胱陰血瀉火邪為主而佐以收澁之劑如牡蠣山茱五味之類不可獨用病本屬熱故宜瀉火因水不足故火動而致便數小便既多水益虛矣故宜補血補血瀉火治其本也收之瀉之治  
治癰疽散惡瘡煎湯洗其標也  
藥作浴湯去皮膚風熱丹腫洗眼除雀盲澀痛  
藥如蒿莖赤子類蚕砂惡

石韋

苦甘微寒清肺金以滋化源

凡行水之藥必皆能先清肺火通膀胱而利水道益精氣補五勞

利濕清熱之功高陽負對黃帝治勞傷用石韋丸

治淋崩發背

炒末冷酒調服

生石陰桑韌如皮背有黃毛去

毛微灸用杏仁滑石射干為使得菖蒲良生古瓦上者  
名瓦韋亦治淋

通淋  
濕熱

海金砂 其寒淡滲除小腸膀胱血分濕熱治腫滿五淋

莖痛得梔子牙硝蓬砂治傷寒熱狂大熱利小便此金底抽薪之義也

莖細如線引竹木上葉紋皺處有砂黃赤色忌火

通利濕  
熱治諸

茵陳 苦燥濕寒勝熱入足太陽經膀胱發汗利水以泄太

陰陽明之濕熱脾為治疸黃之君藥脾胃有濕熱則發

熱甚者身如橘色汗如柏汁亦有寒濕發黃身黃而  
色暗大抵治以茵陳為主陽黃加大黃梔子陰黃加附

宜通利  
濕清暑

子乾薑各隨  
寒熱治之

又治傷寒時疾、狂熱、瘧瘧、頭痛、頭旋、女人

痼痼

皆濕熱  
為痼

香薷

辛散皮膚之蒸熱、溫解心腹之凝結、屬金水而主

肺為清暑之主藥、肺氣清則小便行而熱降

暑必兼濕  
治暑必兼

利濕、若無濕、但  
為乾熱、非暑也

治嘔逆、水腫、

發膏服、小

脚氣、口氣、

煎湯  
含漱

牟服、治霍亂轉筋

時珍曰、暑有乘涼飲冷、致陽氣為陰、  
邪所遏、反中入內、遂病頭痛、發熱惡

寒、煩躁、口渴、吐瀉、霍亂、宜用之以發越陽氣、散暑和脾

則愈、若飲食不節、勞役作喪之人、傷暑大熱、大渴、汗出

如雨、煩躁喘促、或瀉或吐者、乃內傷之症、宜用清暑益

氣湯、人參白虎湯之類、以瀉火益元可也、若用香薷是



身寒寒  
字當熱  
字看傷  
寒必病  
熱  
勞熱補

重虛其表而濟之熱矣。蓋香薷乃夏月解表之藥。如冬月之用麻黃。氣虛者尤不宜多服。今人謂能解暑。絜用代茶。誤矣。李士材曰：香薷為夏月發汗之藥。其性溫熱。只宜于中暑之人。若中熱者誤服之。反成大害。世所未知。按潔古云：中暑為陰症。為不足。中熱為陽症。為有餘。經曰：氣盛身寒。得之傷寒。氣虛身熱。得之傷暑。故中暑宜溫散中。陳者勝。宜冷飲熱。熱宜清涼。服令人瀉。

青蒿 苦寒得春木少陽之令最早。二月生苗。故入少陽厥陰。

血分。肝。治骨蒸勞熱。童便搗葉。取汁蒸膏。瘵勞虛熱。凡苦寒之藥。多傷胃氣。惟

青蒿芬香入脾。獨宜于血。有熱之人。以其不犯胃氣也。黃久瘵。久痢。瘰癧。

惡瘡。鬼氣尸疰。時珍曰：月令通纂言：伏內庚日。采蒿懸門庭。可辟邪。冬至元旦。各服二錢。亦良。

大燥回  
陽補腎  
命火運  
風寒濕  
入八味  
九內亦  
從地黃  
等補陰

則青蒿之治鬼症。補中明目。童便浸葉用熬膏亦良。

使子勿使葉使根勿使莖。

附子 辛甘有毒大熱純陽其性浮而不沉其用走而不

守通行十二經無所不至能引補氣藥以復散失之元

陽引補血藥以滋不足之真陰引發散藥開腠理以逐

在表之風寒。同乾薑桂枝溫引溫煖藥達下焦以祛在

裏之寒濕。能引火下行亦有治三陰傷寒。吳綬曰附子

傷寒傳變三陰中寒夾陰身雖大熱而脉沉細者或厥

冷腹痛甚則唇青囊縮者急須用之若待陰極陽竭而

當與非  
萊牛乳  
二條參  
膏論治

本草集要

卷二

三

用之已遲矣東垣治陰盛格陽傷寒面赤目赤煩渴引  
飲脈七八至但按之則散用薑附湯加人參投半斤得  
汗而愈此神中寒中風目重則為傷又重則為中氣

厥痰厥

虛寒而厥者宜之如傷寒陽盛格陰身冷脈  
伏熱厥似寒者誤投立斃宜承氣白虎等湯咳

逆風嘔噦

胃膈噎可下面食不可下稿在吸門喉間之  
寒嘔噦寒膈噎

厥會也

食下胃脘痛須臾吐出稿在賁門胃之上口也

此上焦名噎

食下良久吐出稿在幽門胃之下口也此

中焦名膈

朝食暮吐稿在關門大小腸下口也此下焦

名反胃

又有痰飲食積瘀血壅塞寒胃口者如寒痰胃冷

則宜薑附參朮

胃稿者當滋潤脾泄命火冷痢寒瀉霍

宜四物牛乳

血瘀者加韭汁脾泄不足冷痢寒瀉霍

亂轉筋

脾虛寒客中焦為霍亂寒客下  
焦肝腎為轉筋然霍亂者禁煎拘攣風痺癰瘰

積聚。督脉爲病。脊強而厥。小兒慢驚。痘瘡灰白。癰疽不

斂。一切沉寒痼冷之症。經曰。陰益生內。寒陽虛生外寒。助陽退陰。殺邪。

辟鬼。本草。通經墮胎。凡陰症用薑附藥。宜冷服。熱因寒。

以寒。則陰益甚。治之以熱。則拒格不納。用熱藥。冷飲下。

監之後。令體既消。熱性便發。情且不違。而致大益。此反

治之妙也。又有寒藥熱飲。治熱症者。此寒因熱。用義亦

相同也。經曰。正者正治。反者反治。如用寒治熱。用熱治

寒。此正治也。或以寒治寒。以熱治熱。此反治也。經所謂

必伏其所主。而先其所因。蓋借寒藥熱藥爲反佐。以作

向導也。亦曰從治。王好古曰。用附子以補火。必防涸水。

如陰虛之人。久服補陽之藥。則虛陽益熾。真陰愈耗。精

血日枯。而氣無所附。麗遂成不救者多矣。母爲烏頭。附生者爲附子。連生

者爲側子。細長者爲天雄。兩岐者爲烏喙。五物同出異名。附子以西川彰明赤水產者爲最。皮黑體圓底平八角重一兩以上者良。

或云二兩者更勝。然難得。

生川發散。熟用峻補。

趙嗣真曰。仲景麻黃附子細辛湯。熟附配麻黃。發中有補。四逆湯。生附配乾薑。補中有發。其旨微矣。丹溪曰。烏附行經。仲景八味丸用爲少陰嚮導。後世因以爲補藥。誤矣。附子走而不守。取其健悍走下。以行地黃之滯耳。相習用爲風藥及補藥。殺人多矣。昂按附子味甘氣熱。峻補元陽。陽微欲絕者。回生起死。非此不爲功。故仲景四逆真武。自通諸湯。多用之。其有功于生民甚大。况古人之日用常方。用之最多。本非禁劑。丹溪乃僅以爲行經之藥。而云用作補劑。多致殺人。言亦過矣。蓋丹溪法重滋陰。故每警陽藥亦其偏也。王節齋曰。氣虛用四君子。

今人用  
黑豆煮  
亦焦

湯血虛用四物湯虛者俱宜加熟附子蓋四物皆  
和平寬緩之劑須得附子健悍之性行之方能成功附  
子熟藥本不可輕用但當病水浸麴裏煨令發拆乘熱  
則雖暑熱時月亦可川也

切片炒黃去火毒用又法甘草二錢鹽水薑汁童便各  
半盞煮熟用畏人參黃耆甘草防風犀角綠苳童便反  
貝母半夏栝蒌白及白欬中其毒者黃連犀角甘草煎  
湯解之黃土水亦可解烏頭功同附子而稍緩附子  
性重峻溫脾逐寒烏頭性輕疎溫脾逐風寒疾宜附子  
風疾宜烏頭烏附尖吐風痰治癰癩取其鋒銳直達

大燥開  
頑痰

病所。丹溪治許自雲屢用瓜蒂梔子苦參藥散等劑吐

數。天雄補下焦命門陽虛。寇宗奭張元素皆云補上

時珍曰其尖皆向下生故下行然補下乃所以益上也

若上焦陽虛則屬心肺之分當用參耆不當用雄附矣

治風寒濕痺爲風家主藥發汗又能止陰汗 側子散

側旁生宜于發散四肢充達皮毛治手足風濕諸痺

草烏頭 辛苦大熱投風勝濕開頑痰治頑瘡以毒攻毒

頗勝川烏然至毒無所釀制不可輕投 野生狀類川

烏亦名烏喙薑汁炒或豆腐煮用熬膏名射罔傳箭射

獸見血立死

燥祛風  
濕治面

疾

白附子 辛其有毒大熱純陽陽明經藥能引藥勢上行

治面上百病陽明之脉營于面白附能去頭面遊風作面脂消斑疵 補肝虛祛風

痰治心痛血痺諸風冷氣中風失音陰下濕癢根如

草烏之小者長寸許皺紋有節炮用陶弘景曰此藥久絕無復真者今惟

涼州

生

燥補命  
火

破故紙一名補骨脂

辛苦大溫入心包命門補腎火以通君

火煖丹田壯元陽縮小便亦治遺尿治五勞七傷五藏之勞七情之傷



補腎命  
菜也  
芸薹油  
滑腸

腰膝冷痛腎冷精流腎虛泄瀉

腎虛則命門火衰不能蒸脾胃脾胃虛寒遲

于運化致飲食減少腹脹腸鳴嘔涎泄瀉如鼎釜火下

無火物終不熟故補命門相火即所以補脾破故紙四

兩五味三兩肉蔻二兩吳茱一兩婦人血氣婦人之血

蓋煮棗九名四神丸治五更腎虧脫氣陷亦

猶男子之腎冷精流墮胎出南番者色赤嶺南者色綠酒浸蒸

用亦有童便乳浸鹽水炒者得胡桃胡麻良惡甘草唐

相國方破故紙十兩酒浸蒸為末胡桃肉二十兩去皮

爛研蜜和每日酒調一匙或水調服百飛霞曰故紙屬

火堅固元陽胡桃樹木潤燥養血有木火

相生之妙忌芸薹羊血加杜仲名尚娥丸

肉蓯蓉其酸鹹溫入腎經血分補命門相火滋潤五藏

益髓強筋治五勞七傷絕陽不興絕陰不產腰膝冷痛

崩帶遺精峻補精血時珍曰補而不峻故有從容之號驟用恐妨心滑

大便長大如臂重至斤許有松子鱗甲者良酒浸一

宿刷去浮甲劈破除內筋膜酒蒸半日又酥炙用忌鐵

燕恭曰今人所用多草從蓉功力稍劣

補陽滑

瑱陽 其溫補陰益精興陽潤燥養筋強筋故能興陽治痿弱滑

大腸便燥者啖之可代從蓉煮粥彌佳鱗甲槓北狀類男陽酥炙

補腎壯

巴戟天 其辛微溫入腎經血分強陰益精治五勞七傷

本草綱目卷之四十五 補益 二 天

辛溫散風濕治風氣脚氣永腫根如連珠擊破中紫

而鮮潔者偽也中雖紫微有白糝粉色而理小暗者真

也蜀產佳山荏根似巴戟但色白人或醋煮以亂之去心酒浸焙用覆盆子

爲使惡丹參

藥補腎  
命除寒

胡盧巴 苦溫純陽入右腎命門煖丹田壯元陽治腎藏

虛冷陽氣不能歸元同附子痼痼冷氣同茴香巴戟川

寒濕脚氣 出嶺南番禺者良云是番萊菔子酒浸暴

或蒸或炒

命 燥補腎

仙茅 辛熱有小毒助命火益陽道明耳目補虛勞治失

溺無子心腹冷氣不能食胃溫腰脚冷痺不能行骨煖筋相

火盛者忌服 葉如茅而畧潤根如小指黃白多涎竹

刀去皮切糯米泔浸去赤汁出毒用忌鐵唐婆羅門始進此方當時

盛傳服之多効照前製陰乾蜜丸酒服禁食牛乳牛肉

許真君書云其能養肉辛能養節苦能養氣鹹能養骨

酸能養筋滑能養膚和苦酒服之必効也

補腎命

淫羊藿 辛香甘溫入肝腎補命門時珍曰手足陽明三焦命門藥益精

氣堅筋骨利小便治絕陽不興絕陰不產冷風勞氣四

補腎命  
去風濕

肢不仁

手足麻木

一名仙靈脾北部有羊一日百合食此

藿所致故名去枝羊脂拌炒山藥為使得酒良

蛇床子

辛苦而溫強陽益陰補腎散寒祛風燥濕治陰

痿蕤濕女子陰痛陰癢

濕生重同蔡煎湯先

子藏虛寒產門不閉

炒熱腎命之病及腰酸體痺帶下脫肛喉痺齒痛濕癰

惡瘡

殺重止癢

風濕諸病煎湯浴去風癢

時珍曰腎命三焦氣分之藥不獨補

助男子而且有益婦人世人舍此而

似小苗而細微

求補藥于遠域豈非貴耳賤目乎

炒殺毒則不辣

以地黃汁拌

惡丹皮貝母巴豆

平補三陰

點按此  
人或感  
他毒未  
可盡歸  
谷于兔  
絲也

平補肝腎

兔絲子

甘辛和平凝正陽之氣入足三陰

腎肝強陰益

精溫而不燥不助相火治五勞七傷精寒淋瀝口苦燥

渴脾虛腎燥而生內熱兔絲益陰清熱祛風明目補衛氣助筋脉益氣力

肥健人補肝腎之効老學庵筆記子族弟少服兔絲子凡數年飲食倍常血氣充盛忽因浴見背腫隨

視隨長乃大疽也適值金銀花開飲至數斤腫遂消兔絲過服尚能作瘡以此知金石藥不可不戒無

根蔓延草上子黃如黍粒得酒良淘去泥沙酒浸一宿

暴乾搗末山藥爲使

覆盆子

甘酸微溫益腎藏而固精補肝虛而明目起陽

痿縮小便。寇目曰服之當澤肌膚烏髭髮。惟汁塗女子

多孕同蜜為膏治肺氣虛寒。李士材曰強腎無燥熱之

之品也。狀如覆盆故名去蒂淘淨搗餅用時酒拌蒸

葉絞汁滴目中出目弦重除膚赤收濕止淚。

平補肝 疾藜子 苦溫補腎辛溫瀉肺氣而散肝風益精明目。以肝

散為補凡補肝 治虛勞腰痛遺精帶下咳逆肺痿乳閉

癥瘕痔漏陰癰。音頻肺肝腎三經之病催生墮胎。刺疾藜

故能破癥下胎 沙苑疾藜綠色似腎。故補炒川亦可刺疾藜

故能破

前脾殺  
三消積

按地黃  
胡麻皆  
其而能  
殺重

三角有刺去刺酒拌蒸

風家宜刺蒺藜補腎則沙苑者為優餘功畧同

堂方牙齒打動者  
蒺藜根燒灰傳之

使君子

甘溫健脾胃除虛熱殺藏虫治五疳便溺瀉痢

瘡癰為小兒諸病要藥

經疏曰五疳便溺瀉痢腹虫皆由脾胃虛弱因而乳停食滯濕

熱痰塞而成脾胃健則積滯消濕熱散水道利而前症

盡除矣時珍曰凡殺虫之藥多是苦辛獨使君子樞子

甘而殺虫每月上旬虫頭向上中旬頭橫下旬向下道

藏云初一至初五虫頭向上凡有虫病者每月上旬空

心食數枚虫

出困蜀五瓣有稜內仁如榧亦可煨食

皆死而出也

久則油黑不可用忌飲熱茶犯之作瀉



操脾胃  
補心腎

宣行氣  
調中

益智子 辛熱本脾藥兼入心腎主君相二火補心氣益

門三焦之不足心為脾母補火故能生土能瀉精固氣本草未載又能開

發鬱結使氣宣通味辛能散溫中進食攝涎唾胃冷則縮小

便腎與膀胱相表裏益智辛溫固腎鹽水炒同治嘔吐

泄瀉客寒犯胃冷氣腹痛崩帶泄精烏藥等分酒煮山藥糊九鹽湯下各補泉九清精固氣因熱

出嶺南形如棗核川仁

砂仁即縮砂辛溫香竄補肺益腎和胃醒脾快氣調中通

行結滯治腹痛痞脹痞滿有傷寒下早裏虛邪大而痞者有食藥痰塞而痞者有脾虛氣

宣行氣  
煖胃

弱而痞者須分虛實治之不宜常用利氣藥恐變為鼓脹鼓脹內脹而外有形痞脹惟覺滿悶而已皆太陰為病噎膈嘔吐上氣咳嗽赤白瀉痢濕熱積滯客于大腸砂仁亦入大小腸經

霍亂轉筋奔豚崩帶祛痰逐冷消食醒酒止痛安胎行氣

則痛止氣散咽喉口齒浮熱化銅鐵骨哽王好古曰得煖香豆蔻入

順則胎安肺得入參益智入脾得黃柏茯苓入腎得赤石脂入大小腸腎通以辛能潤腎燥引諸藥歸宿丹砂地黃用之拌蒸亦取其能達下也經疏曰腎虛氣不歸元用為嚮導殆勝桂附執藥為害

出嶺南研用

白荳蔻 辛熱流行三焦溫煖脾胃三焦利脾胃而為肺轉諸症自平

家本藥 肺主散滯氣消酒積除寒燥濕化食寬膨治脾

本草 卷十一 益智子砂仁白荳蔻

燥脾瀉  
膠

虛癰疾感寒腹痛吐逆反胃肺胃火盛及氣虛者禁用白睛翳膜白睛

屬肺能散肺滯太陽經目皆紅筋起目皆番舶者良研用

肉荳蔻一名肉荳蔻辛溫氣香埋脾煖胃下氣調中逐冷祛痰

消食解酒治積冷心腹脹痛挾痰挾食者並宜之中惡吐沫小兒

吐逆乳食不下又能瀉大腸止虛瀉冷痢初起忌用出嶺

南似草蔻外有皺紋內有斑紋糯米粉裹煨熟用忌鐵

草荳蔻一名草荳蔻辛熱香散煖胃健脾破氣開鬱燥濕祛寒

除痰化食治瘕癥寒瘧佐常山能截瘧或與知母同用取其一陰一陽治寒熱瘴癘盛

痰瘧

寒除痰

燥濕祛

巨調氣  
開鬱

草藥治太陰獨勝之寒。寒客胃痛。散滯氣利膈痰。霍

亂瀉痢噎膈反胃痞滿吐酸痰飲積聚解口臭氣酒毒。

魚肉毒

故食料用之。

過劑助脾熱耗氣損目。

圖產名草慈

如龍眼而微長皮黃白薄而稜峭仁如砂仁而辛香氣

和滇廣所產名草藥如訶子皮黑厚而稜密子粗而辛

臭雖是一物微有不同麴裏煨熟取仁用忌鐵。

香附

一名莎草根。

性平氣香味辛能散微苦能降微甘能和。

乃血中氣藥通行十二經八脉氣分主一切氣。

人身以氣為生。

本草

卷之六 香附

素問中  
仍有寒  
則氣壯  
熱則氣  
泄色九  
氣  
故古人  
治瘍多  
用五香  
連翹飲

氣盛則強。虛則衰。順則平。逆則病。絕則死矣。經曰。怒則氣上。恐則氣下。喜則氣緩。悲則氣消。驚則氣亂。思則氣結。勞則氣耗。此七情之氣也。以香利三焦。解六鬱。痰鬱附為君。隨症而加。升降消導之藥。氣鬱血鬱。止諸痛。通則治。多怒。多憂。痰飲。痞滿。肝腫。腹濕。蠶食鬱。脹飲食積聚。霍亂吐瀉。腎氣脚氣。癰疽瘡瘍。血凝氣滯。一味末服。名獨勝丸。治瘰癧。由鬱怒得者。如瘰初作。以此代茶清。後亦宜服之。天凡瘡疽。喜服香藥。行氣通血。最忌臭穢。不潔觸之。康祖左乳病。瘰。又臆間生核。痛楚半載。麟張王夢授以方。薑汁製香附為末。每服二錢。米飲下。吐血。便血。崩中。帶下。月候不調。行經成塊者。氣之逆愈。將行而痛。氣之滯行後作痛。氣血俱虛也。色淡亦虛也。色紫氣之熱。色黑則熱之甚也。錯經者。氣之亂。肥人

痰多而經阻氣不運也。香附陰中快氣之藥，氣順則血和。暢然須輔以涼藥，補氣之藥。丹溪曰：能引血藥至氣分而生血。此正胎產百病能推陳致新，故諸書皆云：益陽生陰，長之義。行中有補。丹溪曰：天行健，運不息，所以生生無窮。即此理耳。時珍曰：凡人病則氣滯而餒，香附為氣分君藥。臣以參耆佐以甘草，治虛怯甚速也。

去毛用。生則上行胸膈，外達皮

膚，熟則下走肝腎，旁徹腰膝。童便浸炒，則入血分而補

虛。鹽水浸炒，則入血分而潤燥。或蜜水炒。青鹽炒，則補腎氣。

酒浸炒，則行經絡。醋浸炒，則消積聚。且歛其散。薑汁炒，則化

痰飲。炒黑又能止血。忌鐵。時珍曰：得參朮則補氣得歸地則補血得木香則散滯和

中得檀香則理氣醒脾得沉香則升降諸氣得芎藭蒼  
朮則總解諸鬱得梔子黃連則清降火熱得茯苓則交  
濟心腎得茴香破故紙則引氣歸元得厚朴半夏則決  
壅消脹得紫蘇蔥白則發汗散邪得三稜莪朮則消積  
磨塊得艾葉則治血氣煖子宮乃氣病之總司女科之  
仙藥也大抵婦人多鬱氣行則鬱解故服之尤効非宜  
于婦人不宜于男子也李士材曰乃治標之劑惟氣實  
血未大虛者宜之不然恐損氣而燥血愈致其疾矣世  
俗泥于女科仙藥之一語惜未有發明及此者

木香 辛苦而溫三焦氣分之藥能升降諸氣泄肺氣疏

肝氣和脾氣 怒則肝氣上肺氣調則金能制 治一切氣

痛九種心痛 痛歸胃脘口寒痛熱痛氣痛血痛濕痛痰  
痛食痛虺痛悸痛蒸君心不惕受邪真心

痛者。手足冷過。嘔逆。反胃。霍亂。瀉痢。後重。同檳榔。用劉  
庭節。朝發夕死。行血則膿血自愈。瘰癧。痰壅。氣結。瘰癧。癰塊。腫毒。蠱毒。  
調氣則後重自除。衝脈為病。氣逆。聚急。殺鬼物。禦瘴霧。去腋臭。實大腸。消  
食。安胎。氣逆則胎不安。過服泄真氣。丹溪曰。味辛氣升。若陰火  
衝上者。反助火邪。當用黃栢知母。少以木香佐之。王好古曰。本草主氣劣氣不足。  
補也。通壅導氣。破也。安胎健脾胃。補也。除痰癖。癰塊。破  
也。不同如此。汪撓曰。與補藥為佐。則補。與瀉藥為君。則  
瀉。時珍曰。諸氣積鬱。皆屬於肺。上焦氣滯用之者。金鬱  
泄之也。中氣不運。皆屬於脾。中焦氣滯用之者。脾胃喜  
芳香也。大腸氣滯。則後重。膀胱氣不化。則癃秘。肝氣鬱  
則為痛。下焦氣滯用之者。塞者通之也。番舶上來。形如枯骨。味苦粘舌。



者良名青木香

今所用者皆廣木香土木香

磨汁用東垣用黃連製

亦有蒸用麴裏煨用者

煨用實腸止瀉畏火

氣去惡

藿香

辛甘微溫入手足太陰

脾

快氣和中開胃止嘔

胃弱

胃熱而嘔者忌用

去惡氣進飲食治霍亂吐瀉心腹絞痛肺虛

有寒上焦壅熱

能理脾肺之氣古方有藿香正氣散正氣通暢則邪逆自除

出交

廣方莖有節葉微似茄葉古惟川葉今枝梗亦用之因

葉多偽也

燥補腎命治寒

茴香

古作懷香

大茴辛熱入腎膀胱煖升出補命門開胃下

痢

食調中止嘔療小腸冷氣癰疽陰腫病有七種氣血寒水筋孤癰也肝經

病不屬腎經以厥陰肝脈絡陰器也多因寒濕所致亦有挾虛者當加參朮于溫散藥中乾濕脚氣

多食損目發瘡小茴辛平理氣開胃亦治寒疝食料宜

之大如麥粒輕而有細稜者名大茴出寧夏他處小

者名小茴自番舶來實八瓣者名八角茴香炒黃用得

酒良得鹽則入腎發腎邪故治陰疝受病于肝見症于腎大小茴各一兩

為末猪脬一箇連尿入藥酒煮爛為丸服

甘松香 甘溫芳香理諸氣開脾鬱治腹卒滿痛風痺齒

宜理氣  
醒脾

本草 卷二十一 藿香 茴香 甘松香

宣溫中  
辟惡

宣煖  
胃散寒

躡脚膝氣浮煎湯淋洗 出涼州及黔蜀葉如茅根極  
繁密用根

山柰 辛溫煖中辟惡治心腹冷痛寒濕霍亂風重牙痛  
生廣中根葉皆如生薑入合諸香用

良薑 辛熱煖胃散寒消食醒酒治胃脘冷痛凡心口一

心氣痛非也乃胃脘有滯或有虫及因怒因寒而起以  
良薑酒洗七次香附醋洗七次焙研因寒者薑二錢附  
一錢因怒者附二錢薑一錢寒熱兼者每錢半米飲加  
薑汁一匙鹽少許服初梁祖忠心肝痛夢神授此方三  
味等分服後霍亂瀉痢吐惡嘔膈痛瘕冷癰肺胃熱者  
人各炒分用

寒除胃  
冷散浮  
熱

忌之。出嶺南高州子名紅荳蔻溫肺散寒醒脾燥濕。

消食解酒。東垣脾胃藥中常用之。並東壁土炒用。

華菱一作辛熱除胃冷溫中下氣消食祛痰治水瀉氣。

痢。牛乳煎服。虛冷腸鳴。亦入大腸經。冷痰惡心嘔吐酸水。疰瘕陰。

疝。辛散陽明之浮熱治頭痛。偏頭痛者口含溫水隨左右以末吹一字入鼻効。

牙痛。寒痛宜乾薑華菱細辛熱痛宜石膏牙疳風鼻淵痛宜皂角蠟蚕蜂房二烏重痛宜石灰雄黃。

多服泄真氣動脾肺之火損目。出南番嶺南亦有類。

樵子而長青色去挺用頭醋浸刮淨皮栗免傷人肺。

山奈良薑華菱

宣行藥  
確寒

烟草新

辛溫有毒治風寒濕痺滯氣停痰山嵐瘴霧其

氣入口不循常度頃刻而周一身令人通體俱快醒能

使醉醉能使醒饒能使飽飽能使饒人以代酒代茗終

身不厭故一名相思草然火氣薰灼耗血損年人自不覺耳

閩產者佳烟筒中水能解蛇毒

金銀花 甘寒入肺散熱解毒清熱即補虛凡味甘者皆補療風

養血止渴月溪曰癰疽安後發渴黃耆六一湯吞忍治冬九切當忍冬養血黃耆補氣渴何山作

癰疽疥癬楊梅惡瘡腸澀血痢五種尸疰經冬不凋

一名忍冬

又名左纏藤

花葉同功花香尤佳釀酒代茶熬膏

並妙

忍冬酒治癰疽發背一切惡毒初起使服奇効乾者亦可不及生者力速忍冬五兩甘草一兩水二

碗煎至一碗再入酒一碗畧煎分三服一日一夜吃盡

重者日二劑服至大小腸通利則藥力到忍冬丸照前

分兩酒煮晒乾同甘草為末以所煮餘酒打糊為丸陳

藏器云熱毒血痢濃煎服之為末糖調常服能稀痘

蒲公英

一名黃花地丁

其平花黃屬土入太陰陽明

胃脾化熱毒

解食毒消腫核治乳癰

乳頭屬厥陰乳房屬陽明同忍冬煎入少酒服搗敷亦良

疥毒亦為通淋妙品

諸家不言治淋試之甚驗

擦牙烏髭髮

瑞竹堂有還少

丹方取其通腎東垣

白汁塗惡刺

凡螻蛄諸虫盛夏孕

日苦寒腎經若藥

育游諸物上必遺精

本草

卷二

煙草金銀花蒲公英

卷二

毒熱解

湯熱吐  
痰破血  
解毒

汁乾久則有毒。人手觸之成疾。名狐尿刺。慘痛不  
眠。百療難効。取汁厚塗。即愈。千金方極言其功。葉

如蒿。莖花如單瓣菊花。四時有花。花罷飛絮。斷之莖中

有白汁。

鄭方升曰。一莖兩花。高尺許者。掘下數尺。根大  
如拳。旁有人形拱抱。搗汁酒服。治隔噎如神。

紫花地丁

辛苦而寒。治癰疽。發背。疔腫。瘰癧。無名腫毒。

葉如柳而細。夏開紫花。結角。生平地者。起莖。生清淨

者。起蔓。

杜牛膝

一名天名精。一名地松。

性寒微毒。能破血。

一婦產後。口渴氣喘。而赤有血。

大便秘。小便秘。用行血利水藥不効。用杜牛膝濃煎。膏飲下血一桶。小便通而愈。止血。此痰除。

熱解毒殺虫治乳蛾喉痺砂淋血淋良方云濃煎加乳麝少許神効

兒牙關緊閉急慢驚風不省人事者絞汁入好酒醱之即甦以醋并渣傳項下服

汁吐瘡癰驚風服之亦取其吐痰嗽汁止牙疳搗之傳蛇虫螫毒

根白如短牛膝地黃為使煎湯洗痔瘡寒患處良

鴆虱苦辛有小毒殺五藏虫治虺螫腹痛而白唇紅時發時止者為

虫痛肥肉汁調末服沈存中筆記云是杜牛膝子或曰非也最別是一種

粘人衣有狐氣炒熟則香

山荳根苦寒瀉心火以保金氣去肺大腸之風熱心火降則

熱解

濕殺虫



不灼肺而金清肺與大腸相消腫止痛治喉癰喉風齧

表裏肺金清則大腸亦清腫齒痛合之喘滿熱咳腹痛下痢五痔諸瘡解諸藥毒

傳禿瘡蛇狗蜘蛛傷療人馬急黃血熱極所致苗蔓如葶

經冬不凋

牛蒡子一名見祐子一名惡實辛平潤肺解熱散結除風利咽膈

理痰嗽消斑疹利二便行十二經散諸腫瘡瘍之毒利

腰膝凝滯之氣性冷而滑利症虛寒泄瀉者忌服實如蒲萄而褐色

酒拌蒸待有霜拭去用根苦寒竹刀刮淨絞汁蜜和服

濕熱解

濕熱解

治中風汗出乃愈。搗和猪脂貼瘡腫。及反花瘡。肉反出如花狀

山慈菰 其微辛有小毒。功治清熱散結。治癰瘡。疔腫。瘰

癧。結核。醋磨塗。解諸毒。蠱毒。蛇虫。狂犬傷。根與慈菰小

蒜相類。去毛殼用。玉樞丹中用之。廣筆記云。出處州遂昌縣洪山。無毛。少真者有毛。悞也。

漏蘆 鹹。吹。堅。苦。下。泄。寒。勝。熱。入。胃。大。腸。通。肺。小。腸。散。熱。

解毒。通經。下乳。排膿。止血。生肌。殺虫。治遺精。尿血。癰疽。

發背。古方以漏蘆湯為稱首。及預解時行痘疹毒。取其寒勝熱。又能入陽明故也。

出閩中。莖如油麻。枯黑如漆者真。其草拌蒸。連翹為

使

濕熱解  
毒

濕火解  
毒散血  
消痰

貫衆 味苦微寒有毒而能解邪熱之毒治筋中帶下產

後血氣脹痛破癥瘕發斑痘王海藏快化骨哽能軟殺

三垂 根似狗脊而大汁能制三黃化五金伏鍾乳結

砂制汞解毒軟堅以此浸水缸中日飲其水能辟時疫

射干 苦寒有毒能瀉實火火降則血散腫消而痰結自

解故能消心脾老血行太陰厥陰之積痰肺肝治喉痺

咽痛為要藥搗汁醋和噙之引涎干消結核殺痛便毒金方治喉痺有烏窮膏

瀉行水  
破血解  
毒

濕熱  
解毒

瘡母熬甲煎丸治瘡母用之通經閉利大腸鎮肝明目  
皆取其降厥陰相火也

扇竹花根也。葉橫鋪如鳥羽及扇泔水浸一日莖竹  
故一名鳥扇鳥翼

葉煮半日用

續隨子一名千金子辛溫有毒行水破血治癥瘕痰飲冷氣

脹滿蠱毒鬼疰利大小腸下惡滯物塗疥癬瘡玉樞丹用之治

百病多効經疏曰去殼取色白者壓去油用時珍曰續隨與

乃以毒治毒之功大戟澤漆并遂莖葉相似主癰亦相  
似長于利水用之得法皆要藥也

馬蘭子一名金寶甘平治寒疝喉痺癰腫瘡癤婦人血氣煩

大正骨藥草  
其藥射子續隨子馬蘭子

通竅  
救毒  
有形  
物

悶血運崩帶利大小腸久服令人瀉叢生葉似薤而

長厚結角子如麻大赤色有稜炒用治疝用醋拌根葉

同功

蓖麻子 辛甘有毒性善收亦善走能開通諸竅經絡治

偏風不遂喎邪搗餅左貼右右貼左口噤鼻塞耳聾搗爛綿裹塞耳塞鼻

喉痺舌脹油作紙燃能利水氣治水癥浮腫研服當下青黃水壯人只

粒可五能出有形滯物治針刺入肉搗敷傷處頻看刺出即去藥惡努出好肉

竹木骨哽蓖麻子一兩凝水石二兩研勻胞胎不下蓖

血熱涼

二粒巴豆一粒麝香一分貼臍中餅足心胎下即去之若子腸挺出者搗膏塗頂心即收能追膿拔

毒傳癰癰惡瘡外用屢奏奇功鵝鵝油能引藥氣入內

故諸膏多用之然有毒熱氣味頗近巴豆內服不可輕率去皮

水浸每晨用浸水吞一粒

至三四粒治大風疥癩形如牛蟬黃褐有斑鹽水

煮去皮研或取油用忌鐵食蓖麻者一生不得食炒豆犯之則服死

白頭翁 苦堅腎寒涼血入陽明血分胃大治熱毒血痢

仲景治熱痢有白頭翁湯合黃連黃柏秦皮東垣曰腎欲堅急食苦以堅之痢則下焦虛故以純苦之劑堅之

溫瘧寒熱齒痛骨痛腎主齒骨鼻衄禿瘡癰癰疔瘰癧血

齧屬陽明

痔偏墜

搗傳患處

明目消贅

有風反靜無風則搖近根處

有白茸得酒良

瀉熱利水行血

王瓜

即土瓜根

苦寒瀉熱利水治天行熱疾黃疸消渴

搗汁飲

便數帶下月閉瘀血利大小腸排膿消腫下乳

通乳藥多用之

單服亦可墮胎

根如栝蒌之小者味如山藥根子通用

經疏

日主治畧似栝蒌傷寒發斑川王瓜搗汁和伏龍肝末服甚効

通利血

王不留行

其苦而平其性行而不住能走血分通血脈

乃陽明衝任之藥

陽明多氣多血

除風去痺止血定痛通經利

滑腸利

便下乳催生

俗云穿山里孟不留婦人服之乳長流

治金瘡

血止癰瘡散出血出

竹木刺孕婦忌之

花如鈴鐸實如燈籠子殼五稜取

苗子蒸漿水浸用

冬葵子

其寒淡滑潤燥利竅通營衛滋氣脉行津液利

二便消水腫

用榆皮等分煎服

通關格下乳滑胎

秋葵復種

經冬至春作子者名冬葵子根葉同功春葵子亦滑不

堪入藥

蜀葵花赤者治赤帶白者治白帶赤者治血

燥白者治氣燥亦治血淋關格皆取其寒潤滑利之功



通祛風

也。

白鮮皮

氣寒善行味苦性燥

行水故燥

入脾胃除濕熱兼入

膀胱小腸行水道通關節利九竅為諸黃風痺之要藥

一味白鮮皮湯治產後風時

兼治風瘡疥癬女子陰中

珍曰世醫止施之瘡科淺矣

腫痛

濕熱乘虛客腎與膀胱所致

根黃白而心實取皮用惡桑螵

蛸桔梗扶苓草薺

草薺

其苦性平入足陽明厥陰

用

祛風去濕以固下焦

通祛風  
濕補下  
焦

陽明主肉屬濕補肝虛祛風堅筋骨

風濕去則筋骨堅

益精明目

腎有二  
寂淋症  
出于溺  
幾端症  
出于精  
寂

治風寒濕痺腰痛久冷關節老血膀胱宿水陰痿失溺

莖痛遺濁痔瘻惡瘡

諸病皆陽明濕熱流入下焦草薢能除濁分諸古方有草薢分清飲

史國信云若欲興陽先滋筋力若欲便清先分肝火萬金護命方云凡人小便頻數便時痛不可忍此疾必因大腑秘熱不通水液只就小腸大腑愈加乾竭甚則身熱心躁思水即重症也此疾本因貪酒色或過食辛熱葷膩之物積有熱毒腐物瘀血乘虛流入小腸故便時作痛也此便數而痛與淋症瀉而痛不同宜用草薢一兩鹽水炒為末每服二三錢使水道轉入大腸仍以蔥湯頻洗穀道令氣得通則便數及痛自減也

有黃白二種黃長鞭

音硬

白虛軟軟者良薏苡為使畏大

黃柴胡前胡忌茗醋

時珍曰草薢拔熟土茯苓形不同而主治不甚相遠豈一類數種乎

草薺根細長淺白  
莖葉根作塊赤黃

土茯苓

其淡而平陽明主藥

胃大腸

健脾胃祛風濕脾胃

健則營衛從風濕除則筋骨利利小便止瀉泄治筋骨

拘攣楊梅瘡

楊梅瘡古方不載明正德間起于嶺表其症多偏陽明厥陰而兼及他經蓋相

火寄于厥陰肌肉屬于陽明故也醫用輕粉劫劑其性

燥烈入陽明劫去痰涎從口齒出瘡即乾愈然毒氣竄

入經絡筋骨血液枯澀筋失所養變為拘攣瘡漏竟致

廢痼土茯苓能解輕粉之毒

去陽明濕熱川一兩為君

苡仁金銀花防風木通木瓜白鮮皮各五分皂角子四

分氣虛加人參七分

血虛加歸七分名搜風解毒湯

瘰癧瘡腫

濕鬱而為熱鬱而不和則生瘡腫經云濕氣害人皮肉筋脉是也土茯苓淡能滲其能清

通法  
熱種  
冊

患膿疥者煎湯代茶甚妙

大如鴨子連綴而生俗名冷飯團有赤

白二種白者良可煮食亦可生啖忌茶

瀉火散

白歛 苦能泄辛能散甘能緩寒能除熱殺火毒散結氣

生肌止痛治癰疽瘡腫面上疱瘡金瘡撲損箭鏃不出者同丹皮

或半夏為末酒服 歛瘡方多用之故名每與搽凍耳同黃柏末酒調

蔓赤枝有五葉根如卵而長三五枚同窠皮黑肉白一

種赤歛功用皆同鄭奠一日能治溫瘧血痢腸風痔瘻赤白帶下

補勞瀉

預知子 苦寒補五勞七傷治瘰癧氣塊天行溫疾蛇虫

本草 卷二 土茯苓白歛預知子

咬毒殺虫療蠱。綴衣領中凡遇蠱毒則聞其聲而預知之故名。利便催生。藤

生子如皂莢。褐色光潤。出蜀中。云亦難得。

補腎

旱蓮草。一名鰓腸。又名金陵草。又其鹹汁黑補腎止血。黑髮烏髭。千金

云當及時多收其効甚速。經疏云性涼不益脾胃。故千金方金陵煎丸用薑汁和劑。苗如旋覆

實似蓮房。斷之有汁。須臾而黑。熬膏良。

瀉破血  
止血

劉寄奴草。苦溫。破血通經。除癥下脹。止金瘡血。多服令

人吐利。一莖直上。葉尖長。糙滿。花白。莖黃如小菊花。

有白絮如苦蕒絮。子細長。亦似苦蕒子。莖葉花子皆可

消脹殺  
蟲

經明目

用。劉裕小字寄奴。微時嘗射一蛇。明日見童子林中搗藥。問之。答曰。吾王為劉寄奴所傷。合藥傅之。裕曰。玉何不殺之。童曰。寄奴王者。不可殺也。叱之。不見。乃收藥。則每遇金瘡。傅之立愈。

馬鞭草

味苦微寒。破血通經。殺虫。消脹。治氣血癥瘕。瘰

瘡。陰腫。

瘡

墟陌甚多。方莖。葉似益母。對生。夏秋開紅

紫花。穗如車前草。類蓬蒿而細。根白而小。用苗葉。

穀精草

辛溫輕浮。上行。陽明胃。兼入厥陰肝。明目退翳。

之功。在菊花之上。亦治喉痺。齒痛。陽明風熱。收穀後

荒田中生。葉似嫩秧。花如白星。

小兒雀盲者。搗羊肝一具。不洗。竹刀割開。入穀

本草備要

卷二

早蓮草劉寄奴金縷草穀精草

毒

瀉肝明

精煮熟食之。  
或作丸茶下。

青箱子一名草決明

味苦微寒。入厥陰。肝。祛風熱。鎮肝明目。

治青盲障翳。虫疥惡瘡。瞳子散大者。忌服。能助陽火

類雞

冠而穗尖長。

目 瀉肝明

決明子 甘苦鹹平。入肝經。除風熱。治一切目疾。故有決

明之名。又曰益腎精。瞳子神光屬腎。日華曰。明目甚于黑豆。作枕治頭風。

狀如

馬蹄。俗呼馬蹄決明。搗碎煎惡大麻仁。

瀉肝明

麥實 辛溫。溫中明目。耐風寒。下水氣。時珍曰。古人種麥為蔬。收子入藥。今

惟酒麴用其汁耳以香蓼青蓼紫蓼為良

有香蓼青蓼紫蓼赤蓼木蓼水

蓼馬蓼

馬勃

辛平輕虛清肺解熱

東垣普濟消毒飲中用之

散血止嗽治喉

痺咽痛

吹喉中良或加白礬或確掃喉取吐痰愈

鼻衄失音外川傳諸瘡良

生濕地朽木上狀如肺肝紫色虛軟彈之粉出取粉

川

木鱉子

苦溫微甘有小毒利大腸治瀉痢疳積瘰癧瘻

痔乳癰蚌毒消腫追毒生肌除點

音早黑斑

治入外科核

瀉熱外  
用治瘡

輕瀉熱  
外川傳

本草  
卷之六  
蕭子明子製藥集



本草綱目

卷二

青和醬綠色揀去油者能毒狗